



W październiku 2022 roku w czasopiśmie **Journal of Clinical Oncology** zostały opublikowane **4-letnie obserwacje badania KEYNOTE 048: „Pembrolizumab z chemioterapią i bez chemioterapii w leczeniu płaskonabłonkowego raka głowy i szyi nawrotowego lub z przerzutami”**¹

4-letnie obserwacje badania KEYNOTE 048 **potwierdziły utrzymującą się w czasie skuteczność pembrolizumabu** vs schemat Extreme* (PD-L1 dla CPS ≥ 1):¹

KEYTRUDA® w monoterapii w porównaniu do cetuksymabu z chemioterapią¹

Obserwacje 4-letnie


Pembrolizumab vs cetuksymab-chemioterapia, PD-L1 CPS ≥ 1
HR 0,74 (95% CI 0,61–0,89); mediana (95% CI)
12,3 miesiąca (10,8–14,8) vs 10,4 miesiąca (9,0–11,7)

Przeżycie całkowite
w populacji
pacjentów
z ekspresją
PD-L1 z CPS ≥ 1
(Pierwszorzędowy
punkt końcowy)

26%

zmniejszenie ryzyka
zgonu po czterech
latach

Krzywe Kaplana-Meiera przedstawiające OS
u pacjentów z wartością CPS z ekspresją PD-L1 ≥ 1



KEYTRUDA® w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu do cetuksymabu z chemioterapią¹

Obserwacje 4-letnie


Pembrolizumab-chemioterapia vs cetuksymab-chemioterapia, PD-L1 CPS ≥ 1
HR 0,64 (95% CI 0,53–0,78); mediana OS
13,6 miesiąca vs 10,6 miesiąca

Przeżycie całkowite
w populacji
pacjentów
z ekspresją
PD-L1 z CPS ≥ 1
(Pierwszorzędowy
punkt końcowy)

36%

zmniejszenie ryzyka
zgonu po czterech
latach

Krzywe Kaplana-Meiera przedstawiające OS
u pacjentów z wartością CPS z ekspresją PD-L1 ≥ 1



Aby pobrać artykuł kliknij w link poniżej:

**Journal of
Clinical
Oncology®**
An American Society
of Clinical Oncology Journal

Pembrolizumab z chemioterapią i bez chemioterapii
w leczeniu płaskonabłonkowego raka głowy i szyi
nawrotowego lub z przerzutami – uaktualnione
wyniki badania III fazy KEYNOTE-048

Harrington KJ, Burtneess B, Greil R, Soulières D,
Tahara M, de Castro G Jr, et al.

Title: Pembrolizumab z chemioterapią i bez chemioterapii w leczeniu
płaskonabłonkowego raka głowy i szyi nawrotowego lub z
przerzutami – uaktualnione wyniki badania III fazy KEYNOTE-048

Authors: Harrington KJ, Burtneess B, Greil R, Soulières D,
Tahara M, de Castro G Jr, et al.

Reference: DOI: 10.1200/jco.21.02508

<https://library.contentednet.com/articles/rm86h7g3>

Zachęcamy do przeczytania publikacji,

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z: dpoc_poland@merck.com

* Cetuksymab, pochodne platyny i 5-fluorouracyl

Użyte skróty:
HR - współczynnik hazardu (ang. hazard ratio); OS - przeżycie całkowite (ang. overall survival); PD-L1 - ligand programowanej
śmierci komórki 1 (ang. programmed cell death ligand-1); CPS - łączny wynik pozytywny (ang. combined positive score);
CI - przedział ufności (ang. confidence interval)

Referencje:
1. Harrington KJ, Burtneess B, Greil R, et al. Pembrolizumab With or Without Chemotherapy in Recurrent or Metastatic Head and
Neck Squamous Cell Carcinoma: Updated Results of the Phase III KEYNOTE-048 Study. J Clin Oncol. 2023 Feb 1;41(4):790-802.
doi: 10.1200/JCO.21.02508. Epub 2022 Oct 11. PMID: 36219809; PMCID: PMC9902012.

